

**ALTERRA**

RESEARCH INSTITUUT VOOR DE GROENE RUIMTE

*Wageningen 20-5-03**Beste heer Moerman,**Zoals afgesproken, gaat hierbij mijn inventarisatie
volgens hetheer Toudes van de Eerste Landeij
op Voorre.**Heet vriendelijke groeten,*

24 APR. 2018

Bibliotheek
Natuurmonumenten
Norderende 60
1243 JJ 's-Graveland
T (035) 6550933



Natuurmonumenten

2 exemplaren, 1 licht en 1 donker gekopieerd, i.v.m. raster.



Inventarisatie 2002 van Eerste Kansenij volgens methode Tausley

De inventarisatie is vooral op de freatofyten of grondwaterplanten gericht. Van de afreafyten (welke die ook in het droge deen voorkomen) zijn alleen de soorten gemiddeld die een belangrijk aandeel in de deenmillei-vegetatie kunnen hebben.

<i>Agrostis stolonifera</i>	a	<i>Parnassia palustris</i>	oa
<i>Alnus glutinosa</i>	fa	<i>Phragmites australis</i>	fa
<i>Anagallis tenella</i>	ac	<i>Plantago major</i>	oa
<i>Betula pubescens</i>	fa	<i>Polypogon monspeliensis</i>	oa
<i>Calamagrostis epigaeos</i>	a	<i>Potentilla anserina</i>	fa
<i>Carex acutiformis</i>	f	<i>" reptans</i>	oa
<i>Carex disticha</i>	ad	<i>Prunella vulgaris</i>	a
<i>" flacca</i>	a	<i>Pulicaria dysenterica</i>	ac
<i>" oederi</i> sp. <i>oederi</i>	fa	<i>Pyrola rotundifolia</i>	r
<i>" trivialis</i>	a	<i>Ranunculus flammula</i>	a
<i>Centaurium littorale</i>	r	<i>" repens</i>	oa
<i>Cirsium arvense</i>	r	<i>Rhinanthus argutifolius</i>	o
<i>Dactylorhiza maculata</i> sp. <i>pubescens</i>	r	<i>Salix cinerea</i>	o
<i>Echinodorus ranunculoides</i>	ac	<i>" purpurea</i>	r
<i>Eleocharis palustris</i> sp. <i>pal.</i>	a	<i>" repens</i>	ad
<i>" quinqueflora</i>	oa	<i>" trianeta</i>	r
<i>Epipactis helleborifolia</i>	r	<i>Samolus valerandi</i>	o
<i>" palustris</i>	fa	<i>Scirpus tibeticus</i>	oa
<i>Equisetum arvense</i>	o	<i>" setaceus</i>	oa
<i>" palustre</i>	a	<i>Symphitum officinale</i>	r
<i>Eupatorium cannabinum</i>	ad	<i>Trifolium fragiferum</i>	r
<i>Euphrasia stricta</i>	of	<i>" repens</i>	oa
<i>Galium palustre</i>	o	<i>Triglochin palustre</i>	r
<i>" uliginosum</i>	fa	<i>Urtica dioica</i>	r
<i>Hippophae rhamnoides</i>	r		
<i>Holcus lanatus</i>	fa		
<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	a		
<i>Hypericum tiliaceum</i>	r		
<i>Juncus articulatus</i>	a		
<i>" bufonius</i>	oa		
<i>" inflexus</i>	r		
<i>" subnodulosus</i>	ac		
<i>" tenuis</i>	of		
<i>Linum catharticum</i>	oa		
<i>Linterna orata</i>	of		
<i>Lotus tenuis</i>	r		
<i>Lycopodium europaeum</i>	r		
<i>Lysimachia vulgaris</i>	ac		
<i>Lythrum salicaria</i>	o		
<i>Mentha aquatica</i>	a		
<i>Myrica caespitosa</i>	r		

d = dominant

c = co-dominant

a = abundant

f = frequent

o = occasional

r = rare

fa = frequent, local abundant

ac = abundant, " co-dominant

etc.

Inventarisatie 28-8-2002

door G. Rando

Inventarisatie 2002 van Eerste Kansrij volgens methode Tausley

De inventarisatie is vooral op de freatofyten of grondwaterplanten gericht. Van de af-freatofyten (soms die ook in het droge deelvorm voorkomen) zijn alleen de soorten genoemd die een belangrijk aandeel in de deelvorm-vegetatie kunnen hebben.

<i>Agrastis stolonifera</i>	a	<i>Parnassia palustris</i>	oa
<i>Alnus glutinosa</i>	fa	<i>Phragmites australis</i>	fa
<i>Amegallia tenella</i>	ac	<i>Plantago major</i>	oa
<i>Betula pubescens</i>	fa	<i>Platanus grandifolia</i>	oa
<i>Calamagrostis epigejos</i>	a	<i>Potentilla anserina</i>	fa
<i>Carex acuticarpa</i>	f	<i>" septans</i>	oa
<i>Carex disticha</i>	ad	<i>Priestella vulgaris</i>	a
<i>" flacca</i>	a	<i>Pulicaria dysenterica</i>	ac
<i>" oederi</i> ssp. <i>oederi</i>	fa	<i>Pyrola rotundifolia</i>	f
<i>" trinervis</i>	a	<i>Ranunculus flammula</i>	a
<i>Centaurea littoralis</i>	f	<i>" repens</i>	oa
<i>Cirsium arvense</i>	f	<i>Rhinanthus angustifolius</i>	o
<i>Dactylorhiza maculata</i> ssp. <i>purpurea</i>	f	<i>Salix cinerea</i>	o
<i>Echinosorus ramunculoides</i>	ac	<i>" purpurea</i>	f
<i>Eleocharis palustris</i> ssp. <i>pal.</i>	a	<i>" repens</i>	ad
<i>" quinqueflora</i>	oa	<i>" trianeta</i>	f
<i>Epipactis helleborine</i>	f	<i>Samolus valerandi</i>	o
<i>" palustris</i>	fa	<i>Scirpus tabernaemontani</i>	oa
<i>Equisetum arvense</i>	o	<i>" setaceus</i>	oa
<i>" palustre</i>	a	<i>Symphytum officinale</i>	f
<i>Eupatorium cannabinum</i>	ad	<i>Trifolium pratense</i>	f
<i>Euphrasia stricta</i>	of	<i>" repens</i>	oa
<i>Galium palustre</i>	o	<i>Triglochin palustre</i>	f
<i>" uliginosum</i>	fa	<i>Urtica dioica</i>	f
<i>Hippophae rhamnoides</i>	f		
<i>Holcus lanatus</i>	fa		
<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	a		
<i>Hypericum tetrapterum</i>	f		
<i>Juncus articulatus</i>	a		
<i>" bufonius</i>	oa		
<i>" inflexus</i>	f		
<i>" subnodulosus</i>	ac		
<i>" tenuis</i>	of		
<i>Linum catharticum</i>	oa		
<i>Linterna ovata</i>	of		
<i>Lotus tenuis</i>	f		
<i>Lycopodium complanatum</i>	f		
<i>Lythrum salicaria</i>	ac		
<i>Lythrum salicaria</i>	o		
<i>Menyanthes aquatica</i>	a		
<i>Myrica caespitosa</i>	f		

d = dominant

c = co-dominant

a = abundant

f = frequent

o = occasional

f = rare

fa = frequent, local abundant

ac = abundant, " co-dominant

etc.

Inventarisatie 28-8-2002

door G. Rondo