Jan '71

„de Kwade Hoek."

Toen de platselinge vorst met sneeuw Zijn het veel vogels gezameld.
Overall de koperwieken welke toen het nachte weer nog hier waren, hebben zware verlieren geleden. Na de vorst waren de lij zo talen dood gevonden. Volgens schatting zijn er alleen op de kwade Hoek rond de 400 gezameld. Ook zwaluwen nog veel kramsvogels doen het eten van bessen van duindoorns. De rest van de kramsvogels verdween spoedig zuidwaarts.
Tijdens de vorst werd een breed en onder zoek aan inzamelingsactie op touw gezet wat in één dag een onvoorstelbare hoop voedsel op leverde. De gehele actie werd gevoerd op schalen op Vlakkee. Tekes en alles zo pakken waer werd bijeengebracht en verspreid, op de „Schelphoek" „de Punt" en de „kwade Hoek." Door het vele vrij snel invallen van zacht weer werd een groot gedeelte van het voer in de bunker afgeslagen en daar bewaard voor zondig later. De gehele rest van de maand bleef het echter zacht weer, zodat niet gevoerd hoefde te worden. Veel vogels waren ook weggetrokken. Alleen wat zanglijsters, winterkoninkjes, heggemussen en meesen bleven nagaan, Ook toe waren er wat putters in het

terrein, doch deze zwieren meest in de elzen bij Texel.

Langs het strand waren vooral tijdens de vloed veel meeuwen van diverse soorten. Op het gors waren een paar tiental ± 600 brandganzen, welke afwisselend in de polder of op het gors waren.

Merkwaardig was dat tijdens het brandganzenbezoek de reg aanwezige (± 300) grauwe ganzen meetrokken, waarschijnlijk naar de „Scheelhoek." Deze kwamen opdat de brandganzen waren weggetrokken, weer terug. (± 800). Deze bleven de hele maand op het gors, vooral 's morgens werden ze in de polder verjaagd doordat ze beschoten werden. Ook werden ze vaak waargenomen op de zandplaat voor de sluizen, vanwaar ze soms naar de wal zwommen. Hoewel het ertussen liggende geultje een vrij sterke stroom heeft, en vrij diep is. Dit geultje wordt, door het afslijpen van de kwade hoek en het aanslibben van de plaat, steeds meer naar de duinen. Hierdoor wordt het slik steeds kleiner. Op de oostpunt van de kwade hoek is het zo steil dat er maar een verschil van ± 10 meter is tussen eb- en vloedlijn. Daarentegen is ter hoogte van paal 600 (t'tlichtje) en verschil van ± 200 meter. Het strand wordt daar

steeds breder, hoewel de bloedlijn meer naar de duinen komt. De slib is nu helemaal verdwenen uit de muien, zodat deze overal doorwaadbaar of droog zijn. Ter hoogte van het lichtje zijn echter diepe putten in de mui ontstaan, vermoedelijk door draaien van het overstromende water.

Enkele keren kwam het fors onder water voor, in de middag bij hoog water. Het blijkt nu dat uit glanswier het gevaar is dan voor de afsluiting van het klaringsgat. Soms gebeurt het bij zelfs stil weer. Het zeewater is ook nu veel zoeter dan voordien. Es zal daardoor in de toekomst flinke veranderingen in de plantengroei op gaan treden.

Het terrein was verder erg goed. Een paar struikgewassen werden bepland. Het is echter wel goed te zien dat er een droge zomer geweest is, en tevens de lage winters al droog is. Het lijkt er wel op dat het schuimaal en andere begroeiing verdwijnen gaat raken.