

R O O F V O G E L S

De roofvogelstand in de kuststreek van Voorne neemt de laatste tien jaar onrustbarend af.

Vroeger kon men een tiental nesten van kuikendieven vinden. De bosuil kwam veelvuldig voor. Het steenuiltje vertoonde zich in enkele paren. Het Torenvalkje broedde overal in de bossen vrij talrijk terwijl ook overal het boomvalkje broedend werd aangetroffen.

Tegenwoordig vindt men geen enkel nest van een kuikendief meer. De bosuil is zeldzaam geworden, zo ook het torenvalkje, terwijl de boomvalk nog sporadisch voorkomt. Het steenuiltje is geheel verdwenen. De buizerden, de aasgieren van Europa, zals die weleens genoemd worden, die in de winter veelvuldig hier voorkwamen, verdwijnen na een paar weken.

Hoe is dit alles mogelijk?

Behalve door vergiftiging van ratten en muizen etc., die door de roofvogels worden opgegeten en wat daardoor de vergiftiging van de roofvogels te weeg brengt, moeten er andere redenen zijn. Er moeten onverlaten zijn, die met klemmen, schieten of vergif onze roofvogelstand decimeren en waarom? Zuiver uit onwetendheid.

De enige schadelijke roofvogels, zoals de sperwer en de havik, komen bij ons niet ~~meer~~ voor; de eerste wel op de trek maar nimmer in het broedseizoen. De onwetenden zien in een roofvogel hun vijand en dit is volstrekt ten onrechte. Een kuikendief kan in het voorjaar weleens schadelijk zijn, maar hoe verklaart men het dat genoemde vogelsoorten zo totaal zijn uitgegroeid en in de terreinen van Natuurmonumenten, waar zij veelvuldig broedden, thans niet meer voorkomen?

Er is iets mis, maar hoe komt men er achter wie deze misdaad tegen de natuur verricht en waar dit geschiedt?

Ik roep een ieder op mee te werken tot handhaving van deze interessante vogelsoorten van onze fauna en mee te helpen uit te vinden waar het euvel zit.

J. van Hoey Smith
"Strypemonde"

Rockanje, januari 1965.

Uit Postbus 1

ROOFVOGELS

De roofvogelstand in de kuststreek van Voorne neemt de laatste tien jaar onrustbarend af.

Vroeger kon men een tiental nesten van kuikendieven vinden. De bosuil kwam veelvuldig voor. Het steenuiltje vertoonde zich in enkele paren. Het Torenvalkje broedde overal in de bossen vrij talrijk terwijl ook overal e boomvalkje broedend werd aangetroffen.

Tegenwoordig vindt men geen enkel nest van een kuikendief meer. De bosuil is zeldzaam geworden, zo ook het torenvalkje, terwijl de boomvalk nog sporadisch voorkomt. Het steenuiltje is geheel verdwenen. De buizerden, de aasgieren van Europa zoals die wel eens genoemd worden, die in de winter veelvuldig hier voor kwamen, verdwijnen na een paar weken.

Hoe is dit alles mogelijk?

Behalve door vergiftiging van ratten en muizen etc, die door de roofvogels worden opgegeten en wat daardoor de vergiftiging van de roofvogels te weeg brengt, moeten er andere redenen zijn.

Er moeten onverlaten zijn, die met klemmen, schieten of vergif onze roofvogelstand decimeren en waarom? Zuiver uit onwetendheid!

De enige schadelijke roofvogels, zoals de sperwer en de havik, komen bij niet voor; de eerste wel op de trek maar nimmer in het broedseizoen.

De onwetenden zien in een roofvogel vijand en dit is volstrekt ten onrechte. Een kuikendief kan in het voor wel eens schadelijk zijn maar hoe klaart men het dat genoemde vogel en zo totaal zijn uitgegroeid en in de reinen van Natuurmonumenten, zij veelvuldig broedden, thans er voorkomen?

Wat is er mis, maar hoe komt men er toe wie deze misdaad tegen de natuur richt en waar dit geschiedt? Het is niet anders dan ieder op mee te werken tot de vernietiging van deze interessante en van onze fauna en mee te werken om te vinden waar het euvel zit.

J. van Hoey Smith,
„Strypemonde”.

Roosendaal, 15 Januari 1965.

ROOFVOGELS

in de kuststreek van

5 +
en tiental nesten v
oor. Het steenuilt
broedde overal in de
lkje broedend werd
t men geen enkel n
eworden, zo ook he
orkomt. Het steenu
Europa, zals die w
hier voorkwamen,
mogelijk?

giftiging van ratte
gegeten en wat daa
moeten er andere r
schieten of vergi
it onwetendheid.
ijke roofvogels, z
or; de eerste wel
en in een roofvoge
endief kan in het
n het dat genoemde
en van Natuurmonu
voorkomen?

maar hoe komt men
en waar dit gesch
er op mee te werke
n onze fauna en me